FMD

Hogivac

FOOT AND MOUTH DISEASE (FMD) VACCINE



INDICATION

Swine



One shot 2 ml intramuscular

- Piglets: start at 6 weeks of age
- Breeders: 3-4 times per year

Cattle



One shot 2 ml subcutaneous

- Calves: start at 4 months of age
- Booster dose: every 6 months

RECOMMENDATION

- *Do not freeze*
- *Store at 2-8°C*

TYPE OF VACCINE

- ***Monovalent Type O***
  Reg no. 1F 15/66 (B)
- ***Bivalent Type O, A***
  Reg no. 2F 18/67 (B)
- ***Trivalent Type O, A, Asia 1***
  Reg no. 2F 17/67 (B)

PRODUCT HIGHLIGHTS

- ***Water-in-oil-in-water (W/O/W)*** *adjuvant technology from SEPPIC, France.*
- ***Induces immune*** *response against FMD (included strains)*
- *Immune response develops within* ***21 days***
- *Duration of immunity:* ***at least 180 Days***

S.C.R. RESEARCH INTERNATIONAL CO., LTD.

160 Soi Amornphannakorn, Suan Siam Road, Khannayao, Bangkok 10230, Thailand

(+66)2-906-0723-5 contact@scrresearchth.com www.scrresearchth.com

FMD

Hogivac

วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)



ชนิดของวัคซีน

- ***วัคซีนสายพันธุ์เดี่ยว ไทป์ O***
  Reg no. 1F 15/66 (B)
- ***วัคซีน 2 สายพันธุ์ ไทป์ O, A***
  Reg no. 2F 18/67 (B)
- ***วัคซีน 3 สายพันธุ์ ไทป์ O, A, Asia 1***
  Reg no. 2F 17/67 (B)

ขนาดและวิธีการใช้

สุกร

ฉีด 2 มล. เข้ากล้ามเนื้อ ครั้งเดียว

- ลูกสุกร: ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป
- สุกรพันธุ์: ฉีดปีละ 3-4 ครั้ง

โค

ฉีด 2 มล. เข้าใต้ผิวหนัง ครั้งเดียว

- ลูกโค: ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 เดือน ขึ้นไป
- ฉีดซ้ำทุก 6 เดือน

คำแนะนำ

- *ห้ามแช่แข็ง*
- *เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 °C*

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ***สารเสริมฤทธิ์อิมัลชัน W/O/W***
  จาก SEPPIC ประเทศฝรั่งเศส
- ***กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อ FMD***
  ตามสายพันธุ์ที่ระบุ
- *เกิดภูมิคุ้มกัน **ภายใน 21 วัน** หลังฉีด*
- *ระยะภูมิคุ้มกันอย่างน้อย **180 วัน***

บริษัท เอส.ซี.อาร์รีเซิช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

160 ซอยอมรพันธ์นคร ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

02-906-0723-5 contact@scrresearchth.com www.scrresearchth.com